

Notre collègue ajoute qu'il en a vu également un spécimen pris, il y a quelques années, aux environs du Mans (Sarthe).

— M. J. CLERMONT montre de nombreux individus vivants du *Mascurauaria cyrtica* Desbr. [COL. CURCULIONIDAE] provenant, comme le type, de St-Vincent-de-Paul, près Dax (Landes), où cette espèce semble confinée jusqu'ici. Tous ont été pris sous des écorces de platanes, mais on ignore toujours dans quelles conditions l'insecte se développe.

— M. le Dr R. JEANNEL signale les effets produits sur divers Insectes par le bombardement intensif de certaines localités du front occidental. Dans le département de la Meuse, notamment, il a pu constater que l'explosion des gros projectiles en forêt empêche les Lépidoptères diurnes de se poser et provoque la sortie des Noctuelles, qui volent alors en plein jour et en plein soleil. Sous la même influence, certains Coléoptères, surtout des Carabiques et notamment le *Calosoma inquisitor* L., circulaient en nombre sur les sentiers.

Communications.

Description d'un *Cetonia* nouveau de Formose [COL. SCARABAEIDAE]

par A. BOURGOIN.

***Cetonia prasinata*, n. sp.** — *Fronte cuprea, nitida, dense punctata, post oculos transversim viridi opaca; inter oculos cuprea, nitida, in medio longitudinaliter carinata, lateraliter depressa, striato-punctata, flavo-pilosa; clypeo cupreo, nitido, punctato, antice emarginato, angulis anticis rotundatis, vix elevatis; pronoto viridi-opaco, lateraliter cupreo-marginato, disco medio fere laevi, albo-bipunctato, lateraliter sparse punctato; scutello viridi-opaco, elongato, apice vix rotundato; elytris viridibus, opacis, elongatis, leviter lineato-punctatis, post medium plus minusve minute albo-squamosis; lateribus apiceque subrugosis; pygidio aeneo, densissime intricato, leviter carinato, apice flavo-piloso. Corpus subtus pedibusque cupreis, nitidis, flavo-pilosis.*

Occiput cuivreux, brillant, densément ponctué; front, en arrière des yeux, avec une bande transversale mate, verdâtre, lisse, et, à partir de cette bande jusqu'au niveau du bord antérieur des yeux, une carène arrondie, lisse, brillante, dépressions juxta-oculaires profondes, striolées, à pubescence jaunâtre; clypéus cuivreux, brillant, densément et régulièrement ponctué, échancré en avant, à angles antérieurs arron-

dis, à peine relevés. Pronotum à revêtement vert, très mat, sans trace de pubescence, à ponctuation obsolète sur le disque, plus visible sur les côtés, à rebord latéral cuivreux, brillant. Scutellum presque 2 fois aussi long que large à sa base, à côtés légèrement concaves, à sommet presque aigu. Élytres verts, très mats, avec, chez le mâle, cinq lignes de points plus ou moins visibles, très fins, surtout ceux de la série juxtaturale; chez la femelle la ponctuation est plus forte, mais la première série seule est bien alignée; les autres se confondent plus ou moins avec des points supplémentaires interposés; côtés nettement ponctués, en avant, de points striolaires qui s'allongent progressivement en stries rugueuses vers le sommet, celui-ci avec quelques soies courtes; suture subépineuse. Pygidium bronzé, assez brillant, à striolation-ponctuation excessivement dense, fine, mais profonde; carène longitudinale médiane bifurquée aux deux tiers de sa longueur: quatre points blancs squameux équidistants près de la base; un autre semblable, ne touchant pas le rebord, vers le milieu de chaque côté.

Dessous et pattes cuivreux métallique brillant, avec de longs poils dorés sur les côtés du pectus et de l'abdomen et sur le bord interne des fémurs et des tibias; saillie mésosternale allongée, en pointe arrondie, légèrement défléchie; métasternum, au milieu, lisse avec une strie longitudinale, rugueusement striolé sur les côtés. Abdomen ♂ au milieu sillonné, finement et éparsement ponctué, plus fortement sur les côtés, surtout sur le tiers médian de la longueur de chacun des segments 1-4, et sur toute la longueur du 5^e; 6^e segment transversalement déprimé et ponctué sur le tiers médian; abdomen ♀ non sillonné, ponctué à peu près comme chez le mâle, sauf sur le sixième segment où la ponctuation du tiers médian est plus forte. Dans les deux sexes, un point squameux blanc à l'angle postéro-externe des segments 1-3, et un autre plus large sur le bord antérieur, au tiers latéral des segments 3-5.

Longueur (du bord antérieur du pronotum à l'extrémité des élytres): 21.3 mm. — Larg. max.: 9,5 mm.

Description de deux *Trichiini* nouveaux de Formose

[COL. SCARABAEIDAE].

par A. BOURGOIN.

Trichius (?) *cupreipes*, n. sp. — *Capite cupreo, dense punctato, flavo-setoso; clypeo valde marginato, antice sinuato; pronoto cupreo,*